Klinische PNI Einführung

PNI Europe
2020 - 2042

Tag 1

09.00 - 09.45

Erwartungen

Pas auf: jede 30 Minuten, 2 Minuten
Bewegung

Ihre Erwartungen auf Post Its

1. Was erwarten Sie inhaltlich von dieser Weiterbildung?
2. Und in Bezug auf Lernstrategien?
3. Was erwarten Sie von den Lehrern/Coaches?
4. Was erwarten Sie von sich selbst?

Tag 1

09.45 - 10.00

Warum sind Sie hier?

1. Ich will wissen, wie es funktioniert.
2. Ich will wissen, warum es so funktioniert, wie es funktioniert.
3. Ich will meinen Patienten besser helfen.
4. Ich will mir selbst helfen.
5. Ich bin nur neugierig.
6. Ich will den wissenschaftlichen Hintergrund von allem wissen.
7. Weil meine Eltern überlebten und sich fortpflanzten.

Danger	Response	Evolutionary benefit	Actual burden
O ₂	HSR	angiogenesis	Cancer, fibrotic fat
Starvation	IR, LR	Energy storage	Obesity, Metabolic syndrome, Low grade inflammation
Dehydration	AVP	Water and Na retaining	Hypertension, Oedema
Infection	Hyper IIS	Anti-sepsis	Allergy
Violence	NA, A	Flight/fight	Fear, aggression Restlessness, sleeping disorders
Anticipation on danger	NA, SER	Social withdrawing	Depression, autism? Social isolation
Wound healing	HIF-1	Tissue maintenance	Pain, Chronic fatigue
Reproduction	High fertility	Long lasting	Breast, prostate cancer

Wir haben diese Herausforderungen überlebt und dafür sind wir geschaffen.

Die Immunologische und Sensoromotorische Homunculus entwickeln durch Selbst-Wahrnehmung

Immune compartment
cytokine release?

Activation of
memory B cells?

Clonal expansion?

Late cytokine
release?

DC maturation?

Cholinergic
antiinflammatory
pathway

T cell
regulation

- Somatosensory
- Visual
- Auditory
- Gustatory
- Olfactory
- Motor

Immune Computation

Immune system

Wüfling. The Emerging Role of Neuro-Immune Synapses and the Immunological Homunculus in the Context 2019

Schematic illustration of our recent findings of neural structures in secondary lymphoid organs put in context with the concepts of NI-synapse and immunological homunculus. Neural structures are colored green in all drawings as we suppose them to build up one coherent sensory system. The circle in the brain with three colored parts should represent the immunological homunculus, which gets topographically mapped information from different secondary lymphoid organs. Looking at the cellular level, in all lymphoid organs, single immune cells could be found densely surrounded by neural structures (wIC), probably forming neuro-immune synapses. Likewise in all lymphoid organs a high density of neurites always in gate areas could be observed as the neural nexus phenomenon (NN). The two dashed circles represent two different innervation locations of wIC and NN (see text). LN (red): lymph nodes, GALT (brown): gut associated lymphatic tissue, BALT (yellow): bronchus associated lymphatic tissue, NALT (yellow): nasopharynx associated lymphatic tissue, CNS: central nervous system, NN: neural nexus, wIC: neurally hard-wired immune cell.

KOSTEN

Gewinnen

Tag 1

10.30 - 11.00

Welche Auswirkungen hat die
Gesellschaft auf das Gehirn und das
Immunsystem und umgekehrt?

Aktives Lernen

Tag 1
11.00 - 11.15
Die Kaffeepause

Tag 1

11.15 - 11.20

[https://www.youtube.com/watch?
v=Ym9Ub6cla0M](https://www.youtube.com/watch?v=Ym9Ub6cla0M)

Tag 1

11.20 - 12.00

Das Immunsystem, das Gehirn und die
Gesellschaft

Die neun Immunkomponenten

1. Barrieren = entzündungshemmender Teil des angeborenen IS = humoral
2. Pro-entzündliche AIS = Leukozyten
3. Antigen-präsentierende Zellen
4. Th1, T-Lymphozyten mit zytotoxischer Aktivität
5. Th2, B-Lymphozyten humoral
6. Th3, Treg = Immuntoleranz
7. Th17, T-Lymphozyten mit zytotoxischer Aktivität
8. Komplementär System (APP)
9. Die Verhaltens-IS

Alle Immunzellen sind in den Meningen vorhanden

Immunreaktion im Winter und Sommer, Fieber, Süßigkeiten, Gewichtsverlust und Fe-Aufnahme

Einsam in der Welt

**CORONA Virus
Krank**

**‘Entscheidung’
Th2 - AIS
Pro-Inflammatorisch**

**Kortisol Resistent
Estradiol**

**Weniger
Fruchtbarkeit**

Virus

Bakterien - Frühzeitig
Steril - Spät

Curcumin, Resveratrol, Isoflavone, -Epigallocatechin-3-Gallat (EGCG), Lycopin, 3,3' - Diindolylmethan (DIM) und Indol-3-Carbinol (I3C) hemmen miR-155

Die Neurologie der sozialen Verbindung und Einsamkeit

Eisenberger.
nature
neuroscience
VOLUME 15 |
NUMBER 5 | MAY
2012

Chronische soziale Instabilität

Erhöhte Innervation der Lymphknoten durch noradrenerge Nerven und Entzündungsempfindlichkeit = evolutionär korrekt, führt aber nun zur Erkrankung.

Stable social grouping

d Unstable social grouping

● Parenchymal catecholaminergic varicosity

Entzündung

NF- κ B

$p = .011$

Nuclear Factor kappa B

Cortisol Wirkung

Glucocorticoid

$p = .033$

HPA-Achse wird unempfindlich bei Langzeitisolierung

Cole. Genome Biology
2007, 8:R189

Unexpected role of interferon- γ in regulating neuronal connectivity and social behaviour

Mäuse, die kein Interferon produzieren können = weniger soziale Kontakte

Der soziale Kontakt erholt sich nach der Injektion mit T-Lymphozyten, die INF γ

Proper inhibition and social behaviour

Social deficits

Activity of pyramidal neurons in the PFC

Hyperactivity of pyramidal neurons in the PFC

Depletion of T cells

- Genetic (mutations in *Prkdc*)
- Antibody depletion with anti-VLA4

Depletion of IFN γ signalling

- *Ifng*^{-/-}
- *Ifngr1*^{-/-}
- AAV Syn^{Cre} into *Ifngr1*^{fl/fl}
- *Vgat*^{Cre}

Soziale Umgebung

Erläuterung = Total logisch

Soziale Kontakte erfordern zwei grundlegende Funktionen

Schutz vor Viren (T-Zelle - IFN- γ)
Soziale Kompetenz = Lärmentfernung = GABA-Zunahme
über IFN- γ in den Frontallappen

Übereinstimmend zeigen wir, dass hemmende Neuronen auf IFN- γ reagieren und die GABAergen Ströme (γ -Aminobuttersäure) in den Projektionsneuronen erhöhen, was darauf hindeutet, dass IFN- γ eine molekulare Verbindung zwischen der meningealen Immunität und den für das Sozialverhalten rekrutierten neuronalen Schaltkreisen ist.

Evolution of adaptive immunity

Bacteriophagen
“Anti-virale macroschimmels”
“Anti-microschimmels”

Autistische Kinder haben eine Flora, die mehr Propionsäure produziert. Infolgedessen werden mitochondriale Schäden und Hyperaktivität im frontalen Kortex

Propionsäure hemmt das erste Teil der Krebszyklus

Kinder mit
 Autismus haben
 ein klares
 Problem mit
 dem Th1-
 Schutz

Carter. Autism genes and the leukocyte transcriptome in autistic toddlers relate to pathogen interactomes, infection and the immune system. A role for excess neurotrophic sAPP α and reduced antimicrobial A β . *Neurochemistry International* 126 (2019) 36–58

Kinder mit Autismus haben verringerte Sozialkompetenz die mit der IFN- γ Produktion korrelieren

B-Glucan könnte IFN- γ aktivieren, GABA in der PFC induzieren und können diesen Kindern durch Beruhigung der Hyperverbindung helfen

- ASD/SPAD
- control
- ASD/non-SPAD
- non-ASD/SPAD

Beta-Glucan ist der Wirkstoff und verantwortlich für die Produktion von IFN- γ .

	Pre-treatment		Post-treatment	
	Glucan	Placebo	Glucan	Placebo
<i>IL-4 (pg/mL)</i>	5.48 ± 0.92	4.63 ± 0.69	3.66 ± 0.64	4.45 ± 0.85
<i>IL-5 (pg/mL)</i>	8.58 ± 1.58	6.78 ± 0.69	5.81 ± 0.83	6.57 ± 0.68
<i>IFN-α (pg/mL)</i>	6.19 ± 1.18	6.13 ± 0.58	7.83 ± 1.22	6.85 ± 0.80
<i>IL-12 (pg/mL)</i>	11.08 ± 2.43	10.48 ± 1.51	17.31 ± 2.75	9.97 ± 1.54

Mushroom scientific name	Mushroom common names	Immunomodulator	Structure of immunomodulator(s)
<i>A. brasiliensis</i>	Royal sun Agaricus, Himematsutake	Flo-a- β	(1 $\rightarrow$ 6)- β -D-glucan, heteropolysaccharides, polysaccharide-protein complex
		FA-2-b-Md	RNA-protein complex (MW 6200 daltons)
<i>C. volvatus</i>		H-3-B	(1 $\rightarrow$ 3)- β -D-glucan
<i>F. velutipes</i>	Winter mushroom, Enokitake	Flammulin	Protein
<i>G. lucidum</i>	Reishi, Ling Zhi	GLP(AI), Ganopoly, Ganoderans	β -D-glucans, heteropolysaccharides, Glykoproteins
		Protein LZ 8	
<i>G. frondosa</i>	Maitake, Hen-of-the-Woods	MD-fraction	(1 $\rightarrow$ 6)- β -D-glucan with (1 $\rightarrow$ 3)- β -D side chains
		Grifolan	(1 $\rightarrow$ 3)- β -D-glucan with (1 $\rightarrow$ 6)- β -D side chains
<i>H. caput-medusae</i> Syn.	Lion's Mane, Monkey's Head, Yamabushitake		Glucoxytan; Heteroxyloglucan, Glucoxytan-protein complex; Galactoxyloglucan-protein complex
<i>H. erinaceus</i>			
<i>L. edodes</i>	Shiitake, Golden Oak mushroom	Lentinan, KS-2	(1 $\rightarrow$ 3)- β -D-glucan with (1 $\rightarrow$ 6)- β -D-glucosyl branches
		LEM	Complex mixture of polysaccharides and lignin
<i>Lentinus strigellus</i>			Polysaccharides
<i>P. linteus</i>			Polysaccharides
<i>S. commune</i>		Schizophyllan, Sonifilan, SPG	(1 $\rightarrow$ 3)- β -D-glucan with (1 $\rightarrow$ 6)- β -D-glucosyl branches
<i>S. crispa</i>	Cauliflower mushroom	SCG	(1 $\rightarrow$ 3)- β -D-glucan with (1 $\rightarrow$ 6)- β -D-glucosyl branches
<i>T. versicolor</i>	Turkey Tail, Kawaratake, Yun Zhi	Krestin (PSK), PSP	PSK and PSP: heteroglucans with α (1 $\rightarrow$ 4)- and β (1 $\rightarrow$ 3) glycosidic linkages with a protein component; the presence of fucose in PSK and rhamnose and arabinose in PSP distinguishes the compounds
<i>T. fuciformis</i>	White Jelly fungus, Yin-erh	Tremellastin	Glucuronoxylomannans
<i>T. mesenterica</i>			
<i>T. lobayense</i>			Polysaccharide-peptide complex
<i>Tricholoma mongolicum</i>	Mo-ku		Lectin

Enhancement of the Th1-phenotype immune system by the intake of Oyster mushroom (Tamogitake) extract in a double-blind, placebo-controlled study **80 mg**

[Aiko Tanaka](#), [Mie Nishimura](#), [Yuji Sato](#), [Hiroki Sato](#), and [Jun Nishihira](#)*

Composition of Oyster mushroom compared with placebo per 80 ml.

Component	Oyster mushroom	Placebo
Calories (kcal)	2.4	2.1
Water (g)	97.9	80.5
Proteins (g)	0.9	0.0
Lipids (g)	0.1	0.0
Carbohydrates (g)	0.5	0.4
Ash (g)	0.3	0.3
Sodium (mg)	5.7	64
β -glucan (mg)	24	–

(a) Changes in the plasma level of IFN- γ

Cordyceps sinensis
 Maitake
 Shiitake
 Austernpilz

Grifola frondosa (maitake) extract, gestandaardiseerd op minimaal 25% polysachariden	80 mg
Lentinula edodes (shiitake) mycelia extract, bevat lentinan	100 mg
Cordyceps sinensis (Chinese rupsenzwam) mycelium, gestandaardiseerd op minimaal 6% cordycepszuren	150 mg
Pleurotus ostreatus (gewone oesterzwam)	120 mg

Tag 1

Immunsystem und sexuelle Aktivität

Aktives Lernen

Das Text-Kontext-Modell

Kennen Sie Vater

Freiwillige Sex	2%	85%
Stressvolle Sex	8%	5%

F/M : 100/107 = Testosteron = Immun-Suppressiv = Infektion Empfindlichkeit

Vater > 30 Jahr = female > 1%

Totschlag: Biologische Eltern:Pflege-Eltern = 1:120

Down Syndrome = trisomie 21 Chromosom = Lebenswürdig = 50% BMR = 850 Kcal/Tag
Trisomie 17 = Nicht geboren

14 Jahr	1/872
25 Jahr	1/1175
49 Jahr	1/11
55 Jahr	1/10

Frau Orgasmus

Mann Orgasmus

Stress

Entspannt

Stress

Entspannt

Vaginale

Clitoris

Glande

Penis

Parasympatikus

Sympatikus

Sympatikus

Parasympatikus

Testosteron

Estriadol

Estriadol

Testosteron

Kennen Sie Vater

Immune tolerance in pregnancy

PERGAMON

Social Science & Medicine 48 (1999) 253–265

SOCIAL
SCIENCE
— & —
MEDICINE

No fathers' names: a risk factor for infant mortality in the State of Georgia, USA[☆]

James A. Gaudino Jr.^{a, *, 1,2}, Bill Jenkins^{b,c}, Roger W. Rochat^a

Wir fanden heraus, dass das Fehlen des Nachnamens des Vaters ein einzigartiger, unabhängiger Risikofaktor für die Säuglingssterblichkeit ist, der als Risikomarker nützlicher erscheint als ein unverheirateter Status. Solche Befunde legen nahe, dass neben dem Familienstand auch Faktoren, die mit der Anwesenheit männlicher Partner zusammenhängen, die Überlebenschancen der Babys beeinflussen.

Seksuele component

Fragen zur sexuellen Komponente

Jede Veränderung ist essentiell = HPG-Achse = die wichtigste Achse des Hypothalamus. Wenn du dich nicht reproduzieren kannst, gehörst du nicht mehr dazu.

In dem Moment, in dem diese Komponente eine Rolle spielt, schalten Sie sofort auf die Abgabe des Fragebogens zu sexuellen Störungen um.

Dies ist oft ein Tabu; aber von großer Bedeutung (schauen Sie sich nur Menschen mit Fibromyalgie an, von denen viele sexuell oder körperlich missbraucht wurden, bevor sie krank wurden).

Findings. Three themes define the perception of sexuality for these women: (1) Physical impact: don't touch, don't look; (2) Sexuality and identity: fighting against their loss; (3) Impact on the relationship: sexuality as a way of connecting the couple.

Conclusion. Despite limitations, sexuality is important for the identity and quality of life of women with fibromyalgia syndrome. Together with the physical symptomology, guilt, fear and a lack of understanding compromise the coping process. Women need the support of their partner, their socio-family environment and health professionals. Nurses can aid the successful adjustment to sexual problems related to fibromyalgia syndrome.

Sexueller und körperlicher Missbrauch bei Menschen mit Rheuma und FMS

Interview Ratings	FM (N = 36)	RA (N = 33)	χ^2	p
Childhood abuse				
Molestation	58.3% (21)	50.0% (15)	0.46	>.1
Physical assault	41.7% (15)	16.7% (5)	4.84	<.05
Penetration	33.3% (12)	13.3% (4)	3.56	=.06
Adult assault				
Penetration	66.7% (24)	23.3% (7)	12.34	<.001
Physical assault	47.2% (17)	16.7% (5)	6.88	<.01
Lifetime victimization				
Any sexual or physical assault	91.7% (33)	66.7% (20)	6.47	=.01
Both child and adult physical assault	19.4% (7)	3.0% (1)	4.52	<.05
Both child and adult rape	25.0% (9)	6.1% (2)	4.60	<.05

Sexueller Missbrauch bei FMS-Patienten in der Meta-Analyse konform

Outcome	Studies, no.	Subjects, no.	OR (95% CI)	P for overall effect	Heterogeneity, I ² (%)	P for interaction
Sexual abuse, childhood and/or adulthood						
Study population						
Population based	2	10,347	1.69 (1.00–1.88)	0.05	52	0.88
Clinical setting	6	773	1.61 (0.92–2.80)	0.09	29	
Sexual abuse, childhood						
Continent						
America	7	753	2.15 (1.49–3.11)	< 0.0001	13	0.34
Europe	3	734	1.41 (0.69–3.29)	0.43	16	
Sexual abuse, childhood						
Type of assessment						
Interview	3	256	2.23 (0.56–8.85)	0.25	64	0.87
Questionnaire	7	1,231	1.98 (1.43–2.74)	< 0.0001	0	
Sexual abuse, childhood						
Sex composition of samples†						
Only women	6	1,366	1.85 (1.28–2.66)	0.001	25	0.27
Mixed	2	121	3.84 (1.10–13.41)	0.03	30	
Sexual abuse, childhood and/or adulthood						
Sex composition of samples†						
Only women	2	187	1.34 (0.75–2.39)	0.33	0	0.19
Mixed	4	10,600	2.04 (1.62–2.56)	< 0.0001	1	
Sexual abuse, childhood						
Type of controls						
Healthy controls	2	163	3.06 (1.17–8.04)	0.02	0	0.34
Diseases	8	1,324	1.85 (1.27–2.70)	0.001	25	
Sexual abuse, childhood						
Type of FMS diagnosis						
ACR	6	1,057	1.61 (0.96–2.71)	0.07	33	0.21
Other criteria	4	430	2.49 (1.60–3.89)	< 0.0001	0	

* OR = odds ratio; FMS = fibromyalgia syndrome; 95% CI = 95% confidence interval; ACR = American College of Rheumatology.

† Sex composition of the samples is not reported in 2 studies.

Die "Gefahr" in dir

de

FIGURE 5 | Some epidemiological risk factors for preeclampsia.

Kenny LC and Kell DB (2018) Immunological Tolerance, Pregnancy, and Preeclampsia: The Roles of Semen Microbes and the Father. Front. Med. 4:239.

The most thorough analyses are for Canada, where data in a national archive of all homicides known to police indicate that children under 5 years of age were beaten to death by their putative genetic fathers at a rate of 2.6 deaths per million child-years at risk (residing with their fathers) in 1974-1990, while the corresponding rate for stepfathers was over 120 times greater at 321.6 deaths per million child-years at risk (Daly & Wilson 2001). Note that because few small children *have* stepfathers, this rate differential does not, in itself, convey anything about the absolute numbers of victims; what these rates represent are 74 fatal batterings by genetic fathers in 28.3 million child-years at risk, and 55 by stepfathers in 0.17 million child-years at risk.

- (1) 9 fathers and 6 *de facto* stepfathers (live-in “mothers’ boyfriends”) were identified as killers of small children (median age 1 year) in a Birmingham, Alabama sample (Lyman et al. 2003);
- (2) 4 fathers and 4 “mothers’ boyfriends” were killers of infants (median age 6.5 months) in a Dayton, Ohio sample (Hicks & Gaughan 1995);
- (3) 11 fathers and 15 (registered marriage plus *de facto*) stepfathers (plus an additional 2 mothers’ boyfriends who did not coreside with their victims) inflicted fatal injuries on preschool-age children in Missouri over a 3-year period (Stiffman et al. 2002); and
- (4) 14 fathers and 9 (registered marriage plus *de facto*) stepfathers were killers of preschool-age children in an analysis of such murders by U.S. Air Force personnel (Lucas et al. 2002).

Hormone erleichtern ein Immunprofil während der Schwangerschaft, aber sie sind nicht entscheidend. Bestimmend ist der Kontext (Text-Kontext-Modell)

Lorenz, . Sexual activity modulates shifts in Th1/Th2 cytokine profile across the menstrual cycle: An observational study. Fertil Steril. 2015 December ; 104(6): 1513–1521

Lorenz,. Sexual activity modulates shifts in Th1/Th2 cytokine profile across the menstrual cycle: An observational study. Fertil Steril. 2015 December ; 104(6): 1513–1521

Lorenz, . Sexual activity modulates shifts in Th1/Th2 cytokine profile across the menstrual cycle: An observational study. Fertil Steril. 2015 December ; 104(6): 1513–1521

Text =
Charakter =
Persönlichkeit + Identität
23 : 77

Sexuell aktive Frau

Sexuell inaktive Frau

Schwangere Frau

Neurologisch (Sinne) + Immunsystem

Endokrinologie

Verhalten

CT

Neurologisch (Sinne) + Immunsystem

Endokrinologie

Verhalten

Leptin Funktion

Leptin Funktion

Biologische Vater

Hemmung
Anti-Incest

N. Arcuatus
INAH

HPG-Achse
Estradiol/Testosteron
Extra Eisprung
2/3 X Spermatozoiden

Sexuelle Reifung

< 250 Jahr = 17 Jahr
20 Jahr = 12 Jahr

Leptin

Nahrung (0-14 Jahr)

Anabole Reiz

Fettmenge
Frau 12 - 20%
Mann 8 - 16%

Katabole Reiz

Stress-Volle Sex

NA/A/Cortisol/Aldosteron/GH/Glukagon

Glycerol
FFS

Adipozyten

Glukose
Keton

N. Arcuatus (Hypothalamus)

Orexigen/Anorexigen Neuronen (Energie)
Interstitial Nucleus Anterior Hypothalamus
(SexHormoneReleasingHormonePulseRegulator)

Leptin Funktion

N. Arcuatus
Energie

Fieber (250 kcal/24 Stunde)
Sympatikus - Zittern
Braunes Fett (Glukose/Fett)

Kein Unterstützung

Alleine

Leptin

FF
IL6, TNF-alfa

NA/A/Cortisol/Aldosteron/
GH/Glukagon

Angeborene IS (FF)
IL1, IL6, TNF, HMGB1
TumorNecrosisFactor,
HighMobileGroupBox-1

Infektion
PAMP

DAMP

TG

Glycerol
FFS

Adipozyten - Lipolyse

Glukose - IS
Keton - Rest

Extreme male brain

Extreme female brain

Father absence...

Vater-Abwesenheit führt zu Motivation und Muskeln

Percentage of Children Living in Father-Absent Homes, 1960 to 2004

Father absence

Single-Mother Families 1960-2006

Father absence syndrome

The Hundred Billion Dollar Man The hundred billion dollar man. No, he's not a new superhero with bionic limbs who can run through walls and is more powerful than a locomotive. The hundred billion dollar man is the personification of the annual cost of absentee fathers to American society. That was the conclusion of a 2008 report written by Christopher Einolf and the late Steven Nock for the National Fatherhood Initiative. The greatest plague to ever hit this country: it is the root cause for the greatest psychological, physical, emotional, mental, and social devastation in the history of the world. The disease is Father Deficiency. It goes beyond just being fatherless but also includes fathers who were present yet absent. Considered by most Americans the number-one social ill in the country, the devastation can be seen in the following statistics about fatherless homes compiled by the Department of Justice: 63 percent of youth suicides are from fatherless homes. 90 percent of all homeless and runaway youths are from fatherless homes. 85 percent of children who exhibit behavioral disorders are from fatherless homes. 71 percent of high school dropouts are from fatherless homes. 70 percent of youths in state institutions are from fatherless homes. 75 percent of adolescent patients in substance abuse centers are from fatherless homes. 85 percent of rapists motivated by displaced anger are from fatherless homes. 71 percent of teenage pregnancies are to children of single parents. U.S. Dept. of Health and Human Services Nearly 75 percent of American children living in single-parent families will experience poverty before they turn eleven.

Tag 1
Mittagspause
12.30 - 13.30

Tag 1

13.30 - 14.00

Aktives Lernen

Bestandsaufnahme Ihres Wissens

Aufträge

Welche Teile des Körpers gehören zu den Schleimhäuten?

Wie ist die Darmwand aufgebaut

Was ist die Rolle des enterischen Nervensystems

Welche Rolle spielen Bakteriom, Viroid und Fungoom?

Was ist die normale Laufzeit des Stuhls

Was ist ein leaky gut?

Was ist das Hyperpermeabilitätssyndrom?

Gibt es ein Gewebe-Mikrobiom?

Was ist eigentlich ein LGI?

Der Darm

Leaky Gut und Leaky Brain Syndrom

Wo Gesundheit beginnt

0. metamodel = Risikofaktoren

Transgenerationelles
assoziiertes
molekulares Muster

PAMP
Alarminen
Molekularer DAMP

Molekulare Muster im
Zusammenhang mit
Sexualität

Molekulare Muster im
Zusammenhang mit der
Kognition

Molekulare Muster im
Zusammenhang mit
der Gesellschaft

Molekulare Muster in
Verbindung mit
Emotionen

Das Öffnen von Barrieren wird vom Körper als "Loch" erlebt. Jedes Loch wird mit Fettzellen gefüllt, um eine Sepsis zu verhindern. Dies führt zu einer Phagozytose von Toxinen und Krankheitserregern durch diese Fettzellen, die dann LPS und Toxine in das Blut freisetzen. Aufgrund der Abwesenheit von lebenden Organismen ist das Immunsystem nur mäßig aktiviert --> geringgradige Entzündung

Es kommt also zu einer Kälte Entzündung, die durch eine **INDIREKTE** (über FAT) Aktivierung des Immunsystems hervorgerufen wird.

Fat infiltration of paraspinal muscles is associated with low back pain, disability, and structural abnormalities in community-based adults

Teichtahl. The Spine Journal 15 (2015) 1593–1601

Physical inactivity is associated with narrower lumbar intervertebral discs, high fat content of paraspinal muscles and low back pain and disability

Perikarditis; Verhärtung des Herzbeutels und erhöhter Flüssigkeitsdruck auf den Herzmuskel. Infiltration von Fettzellen

Pruente R, Restrepo CS, Ocazonez D, Suby-Long T, Vargas D. Fatty lesions in and around the heart: a pictorial review. Br J Radiol 2015;88:

Zusammenhang zwischen NAFLD, METS und Perikardfettspeicherung

1. Leber
2. Herz
3. Muskeln (3 Wochen)
4. Fettgewebe (20 Wochen)

Park SY, et al. Unraveling the temporal pattern of diet-induced insulin resistance in individual organs and cardiac dysfunction in C57BL/6 mice. *Diabetes*. 2005; 54:3530–3540

Fettspeicherung im Herzen

Perilipin (PLIN) 1 = Adipozyten = zwischen
Perilipin (PLIN) 2 = Herzmuskelzellen = innen

Mazzali. J Clin Endocrinol Metab, September 2015, 100(9):3364–3371

Fettspeicherung im Herzen bei Herzinsuffizienz

Perilipin (PLIN) 2 = Herzmuskelzellen

Fettspeicherung führt zu Zellapoptose und chronischer HIF1-Aktivität, die das Herz veranlasst, Gewebe zu verbinden

Leaky gut, leaky brain: the role of zonulin

The discovery of **ZONULIN** began with a failed attempt to develop a cholera vaccine¹

ZONULIN has been identified as a biomarker for many conditions including: **COELIAC DISEASE, INFLAMMATORY BOWEL DISEASE, TYPE 1 DIABETES, ASTHMA, MULTIPLE SCLEROSIS, SCHIZOPHRENIA AND CANCER**^{2,3}

ZONULIN AND THE LEAKY BRAIN HYPOTHESIS²⁻¹⁴

1 ZONULIN RELEASE

- Release of zonulin triggered by endothelial cells exposure to gliadin and pathogenic bacteria.
- Zonulin stimulates opening of TJs.
- Increase in intestinal permeability.
- Increased passage of stressors into lamina propria.

L. RHAMNOSUS (LGG) increases TJ protein gene expression, inhibits zonulin release and restores intestinal permeability.⁴

L. PLANTARUM, L. ACIDOPHILUS and *B. LONGUM* increase TJ protein gene expression, inhibits zonulin release and restores intestinal permeability.⁵

ZINC enhances TJ barrier function.¹⁰

PROBIOTICS may competitively inhibit pathogenic bacteria from stimulating zonulin release.

2 IMMUNE RESPONSE DEVELOPMENT OF LEAKY GUT

- Increased exposure to stressors triggers immune response and inflammation.
- A vicious cycle develops where inflammation and tissue damage further increase intestinal permeability, leading to even greater passage of stressors therefore perpetuating the cycle.
- Altered immune responses and increased inflammation in the gut also interact with HPA axis and neurotransmitter metabolism.

PROBIOTICS modulate immune response and down-regulate inflammation, thereby promoting healthy gut barrier function.⁴

ZINC supports healthy immune function and aids healing.¹¹

3 STRESSORS ENTER CIRCULATION

- Stressors, including zonulin, TJ proteins, antigens, pathogens, toxins, bacterial lipopolysaccharide, inflammatory cytokines and antibodies enter into circulation.

PROBIOTICS reduce systemic inflammatory cytokines and lipopolysaccharide burden.¹²

4 BLOOD BRAIN BARRIER DYSFUNCTION – LEAKY BRAIN

- The BBB includes endothelial cells and TJs.
- Astrocytes located beneath endothelial cells prevent entry of unwanted molecules across the BBB.
- Zonulin from the blood binds to zonulin receptors on the BBB.
- Zonulin stimulates opening of TJs.
- Similar to what happens in leaky gut, stressors, including zonulin, TJ proteins, antigens, pathogens, toxins, bacterial lipopolysaccharide, inflammatory cytokines and antibodies are allowed passage into the brain.

Gut microbiota may regulate BBB via modulation of TJ protein expression and production of short chain fatty acids.¹⁰ PROBIOTICS may be beneficial.

ZINC enhances TJ barrier function.¹⁰

5 IMMUNE RESPONSE NEUROINFLAMMATION

- Increased passage of unwanted molecules causes damage to astrocytes.
- Immune response is stimulated by microglia.
- A vicious cycle of increased passage of stressors and inflammation develops, leading to neuroinflammation.
- Neuroinflammation can also impact on brain communication with the gut and HPA axis.
- Chronic neuroinflammation has been associated with various conditions including mood disorders, Alzheimer's disease, autism spectrum disorders, dementia, schizophrenia, cognitive decline and mental fatigue.

Short chain fatty acids may reverse detrimental effects on brain cells.¹³ PROBIOTICS may be beneficial.

Die Achse
Bluthochdruck - Gehirn -
Darm.

Erstmals wird gezeigt,
dass die Hemmung der
Neuroinflammation
durch die Behandlung
der Mikrogliazellen den
Bluthochdruck beseitigt
und die Darmflora
verändert. Klinische PNI
auf höchstem Niveau

Die schaltungstechnische Beziehung zwischen prohypertensiven Faktoren, Mikrogliaaktivierung, Sympathikusausfluss und Darmflora in der Pathophysiologie der Hypertonie. Neurogene Entzündungen und oxidativer Stress sind wichtige molekulare Prozesse, die die Darmachse des Gehirns antreiben. Ang = Angiotensin, PVN, paraventriculärer Kern, und SNS, sympathisches Nervensystem.

Touyz. Microglia, the Missing Link in the Brain-Gut-Hypertension Axis. *Circ Res.* 2019;124:671-673.

Nachweis, dass die Krankheitserreger tatsächlich das Gewebe erreichen und zur Pathophysiologie chronischer Krankheiten beitragen

Vollblutausstriche von einem thromboembolischen ischämischen Schlaganfall. (A) Hyperaktivierte Thrombozytenmasse mit Pseudopodien und Mikropartikelbildung. (B) Hyperaktivierte Masse von Thrombozyten mit Fusion und spontan gebildete Fibrin-Fasern, im Vollblut. Diese aktivierte Masse ist eng mit einem abnormal gebildeten Erythrozyten verwandt, der mit Plasmaproteine/Mikroparate, die aus apoptotischen, hyperaktiven Plasmaproteinen/Mikroparaten, Thrombozyten oder geschädigten Erythrozyten gewonnen werden. Erläuterung der Sterne und Pfeile: in (A): rotes Sternchen: Pseudokörperbildung; blaue Pfeile: Mikropartikel.

In (B): blaue Pfeile: Mikropartikel; grünes Sternchen: Fibrinbildung, die mit dem Pseudopodion einer hyperaktivierten Fibrinfaser verschmilzt, gestaffelte Thrombozyten (weißes Sternchen). Beachten Sie wichtige Pseudopodien/Fibrine, die aus der dispergierten Thrombozytenmasse (weißes Sternchen) austreten. Bakterium (pseudo-farbig in gelb-braun) wird durch einen weißen Block dargestellt

Kell. On the translocation of bacteria and their lipopolysaccharides between blood and peripheral locations in chronic, inflammatory diseases: the central roles of LPS and LPS-induced cell death. The Royal Society of Chemistry 2015

Innate Immunity/Inflammation

Pruimboom, L. The universal pathways of chronic western disease. Van Nature 2009

Auch neurogene Entzündungen führen zu LGI

Die undichten Barrieren

Die wichtigsten Barrieren sind die Blut-Hirn-Schranke, die Blut-Gastrointestinal-Schranke (GBB), Blut-, Augen- und Blutnetzwerkbarrieren, Blutplazenta- und Bluthodenbarrieren, die Blut-Thymus-Schranke und die Blut-Lungen- oder Atemwegsbarriere. Jede dieser Barrieren schützt verletzbare und empfindliche Organe und Systeme.

Erhöhte Darmdurchlässigkeit und Erkrankungen

1 Mechanismus für fast alle chronischen Krankheiten

[Disease](#) [Tissue/Organ](#) [Citation](#)

- 1. Allergies Various Liu et al. Acta Paediatrica 2005;94:386-93
- 2. Ankylosing Spondylitis Skeletal system Vaile JH et al. J Rheumatol 1999;26:128-35
- 3. Aphthous stomatis Mouth Veloso FT et al. Hepatogastroenterol 1987;34:36-7
- 4. Asthma Lungs Benard A et al. J Allergy Clin Immun 1996;97:1173-
- 5. Autism Nerve/Brain White JF. Exp Bio Med 2003;228:639-49
- 6. Autoimmune gastritis GI Tract Greenwood DL et al. Eur J Pediatr 2008;167:917-25
- 7. Autoimmune hepatitis Liver Terjung B Clin Rev Allergy Immunol 2009;36:40-51
- 8. Behcet's Syndrome Small blood vessels Fresko I et al. Ann Rheum Dis 2001;60:65-6
- 9. Celiac Disease Gut Schulzke JD et al. Pediatric Res 1998;43:435-41
- 10. Chronic Fatigue Synd Multiple Maes M et al. Neuroendol Lett 2007;28:739-44
- 11. Crohn's disease Gut Caradonna L et al. J Endotoxin Res 2000;6:205-14
- 12. Depression Brain Maes M et al. Neuroendocrinol Lett 2008;29:117-24
- 13. Dermatitis
 - herpetiformis Skin Kieffer M et al. Br J Dermatol 1983;108:673-8
- 14. Diabetes, Type 1 Pancreas Sapone A et al. Diabetes 2006;55:1443-49
- 15. Eczema Skin Hamilton et al. Q J Med 1985;56:559-67
- 16. Gut migraine children Gut Amery WK et al. Cephalalgia 1989;9:227-9

Verhoogde darm doorlaatbaarheid en ziekten
1 mechanisme voor zo goed als alle chronische aandoeningen

• **Disease Tissue/Organ Citation**

- 17. Hashimoto's Thyroiditis Thyroid Sasso FC et al. Gut 2004;53:1878-80
- 18. IgG Nephropathy Kidney Rostoker G et al. Nephron 1993;63:286-290.
- 19. Intrahepatic cholestasis
• of pregnancy Liver Reyes H et al. Hepatology 2006;43:715-22
- 20. Juvenile Arthritis Collagen/joints Picco P et al. Clin Exp Rheumatol 2000;18:773-8
- 21. Lupus erythematosis Multiple Apperloo HZ et al. Epidemiol Infect 1994;112:367-73
- 22. Multiple sclerosis Nerve/Brain Yacyshyn B et al. Dig Dis Sci 1996;41:2493-98
- 23. Pemphigus Skin Kieffer M et al. Br J Dermatol 1983;108:673-8
- 24. Primary Biliary Cirrh Liver Di Leo V et al. Eur J Gastro Hepatol 2003;15:967-73
- 25. Psoriasis Skin Hamilton et al. Q J Med 1985;56:559-67
- 26. Rheumatoid arthritis Joints Smith MD et al. J Rheumatol 1985;12:299-305
- 27. Rosacea Skin Kendall SN. Exp Dermatol 2004;29:297-99
- 28. Schizophrenia Brain Wood NC et al. Br J Psychiatry 1987;150:853-6
- 29. Scleroderma Connective tissue Caserta L et al. Rheumatol Int 2003;23:226-30
- 30. Sclerosing Cholangitis Liver Terjung B Clin Rev Allergy Immunol 2009;36:40-51
- 31. Spontaneous abortion Uterus Friebe A Int J Biochem Cell Biol 2008;40:2348-52
- 32. Ulcerative colitis Gut Caradonna L et al. J Endotoxin Res 2000;6:205-14
- 33. Urticaria Skin Buhner S et al. Allergy 2004;59:1118-23
- 34. Uveitis Eye Benitez JM et al. Eye 2000 14(pt 3A):340-3

Erhöhte Darm- und LGI-Durchlässigkeit und Krankheiten 2 Mechanismen für fast alle chronischen Krankheiten

-Krankheit Gewebe/Organ Zitat

- [35. CVD Blood vessels Orr JS et al. Hypertension 2008;51\(6\):1519 - 1524](#)
- 36. Alzheimer Brain Watkins L. Brain Beh Imm 2008**

The dietary intake of wheat and other cereal grains and their role in inflammation. de Punder K, Pruimboom L. Nutrients 2013;5:771-87.

1. Schleimhaut
2. Glykokalyx: Transmembran-Glykokonjugatschicht
Glykokalyx-Abmessungen:
(400-500 nm dick) & Pore
Durchmesser:(7,4 - 28,8 nm)
Funktion: Selektiv
Barriere gegen passive
Diffusion von Bakterien,
Viren & seltsame
Material, mit dem
Kontakt mit Enterozyten
verhindert
3. Microvilli
4. Zellmembran (Enterozyten, "M"-
Zellen, Becherzellen, Paneth-Zellen
oder enteroendokrine Zellen)

The Agricultural Revolution: Major Plant Choices for Domestication

Toxins are ineffective
unless they can cross
the gut & enter the animal

Merkmale erfolgreicher Sekundärstoffe:

1. Fähigkeit zur Resistenz gegen Darmprotease-Enzyme
2. Fähigkeit, die Auskleidung der Darmzellen von Insekten und Wirbeltieren zu durchbrechen, indem die Durchlässigkeit der Darmzellen erhöht oder die Membran der Darmzellen aufgelöst wird.
3. Fähigkeit zur Zerstörung der Zellmembranen von Bakterien, Pilzen und anderen einfachen Zellorganismen.
4. Fähigkeit, zusätzliche Toxine zu verabreichen, sobald die Zellmembranen durchbrochen sind.

**Baobab = 500 Glucanen
= Mucus - Schicht**

Sacrifice food
Mango
Algen
Honig = > 10 Glucanen
Okra
Pilzen

Lektine und Organempfindlichkeit

Gewebe/Organ	Weizen-Agglutinin	Soja-Agglutinin	Erdnuss-Agglutinin	Linsen agglutinin	Erbsen - Agglutinin	Bohnen - Agglutinin
<i>Haut</i>	*	*	*	*		*
<i>Mundschleimhaut</i>	*	*	*	*		
<i>Magen</i>	*					
<i>Parietalzellen</i>		*	*			
<i>Darmschleimhaut</i>	*	*				*
<i>Kolonschleimhaut</i>	*			*		
<i>Bindegewebe</i>	*			*	*	*
<i>Schilddrüse</i>	*	*		*		*
<i>Knorpel</i>	*	*	*			
<i>Leber</i>	*	*	*			*
<i>Bauchspeicheldrüse</i>	*					*
<i>Niere</i>	*			*		*
<i>Prostata</i>	*		*	*		
<i>Skelettmuskulatur</i>	*	*	*		*	
<i>Herzmuskel</i>	*	*				
<i>Brüste</i>	*	*	*			
<i>Zirbeldrüse</i>	*		*			
<i>Auge</i>		*	*		*	*
<i>Gehirn (Myelin)</i>	*			*		*

Bacterially-mediated gut translocation

Die Mechanismen sind vielfältig und es führt zu einer Infiltration des Mikrotoms in alle Gewebe.

	Absorptive cell		Myofibroblast		LPS
	Entero-endocrine cell		Macrophage		TNFα
	Goblet cell		T cell		
	Paneth cell		B cell		
	Stem cell		Dendritic cell		
	Cup cell		Bacteria		
	M cell				

Kell. On the translocation of bacteria and their lipopolysaccharides between blood and peripheral locations in chronic, inflammatory diseases: the central roles of LPS and LPS-induced cell death. The Royal Society of Chemistry 2015

Lebensmittelzusatzstoffe erhöhen die intestinale Permeabilität und das Risiko von Autoimmunerkrankungen

Mehr Alzheimer und andere Neurodegenerative Krankheiten

A

General structure of LPS

B The core structure of lipid A

Der Fettanteil von
Lipopolysaccharide

Es kommt also zu einer Kälteentzündung, die durch eine **INDIREKTE** (über FAT) Aktivierung des Immunsystems hervorgerufen wird.

PNI - Systemmedizin

Die meisten, wenn nicht alle chronischen Erkrankungen sind über das Leaky Gut Syndrom und LGI miteinander verbunden.

Tag 1
15.00 - 15.15
Die Kaffeepause

Tag 1
15.15 - 15.45
Erste Behandlung

ZEIT

Physiologische Ablauf

Die schaltungstechnische Beziehung zwischen prohypertensiven Faktoren, Mikrogliaaktivierung, Sympathikusausfluss und Darmflora in der Pathophysiologie der Hypertonie. Neurogene Entzündungen und oxidativer Stress sind wichtige molekulare Prozesse, die die Darmachse des Gehirns antreiben. Ang = Angiotensin, PVN, paraventriculärer Kern, und SNS, sympathisches Nervensystem.

Touyz. Microglia, the Missing Link in the Brain-Gut-Hypertension Axis. *Circ Res.* 2019;124:671-673.

ZEIT

Angst für das **Unbekannte**
Coronavirus

**Emotional
Associated
Molecular
Pattern**

PFC
Bewusst

Emotional
Motor System

Freisetzung
Einfache Zucker
im Mund

**Benigne H2O2
Bakterien**

**Maligne Toxinen
produzierende
Bakterien**

Fusobakterien nucleatum
Porphyromonas gingivales
Treponema dentatum

Amylase
Reiche Speichel

Amygdala

Trigeminus

**Motor
Neuronen**

N. Facialis

**Vagale
Speichel
(nächste Bild)**

**Acetylcholine
STOP Signale
Immunsystem**

**Emotional
Periodontal
Stress
Syndrome**

Spannung in
Masefer
Freisetzung von
Glutamat im Kiefer

Gesichtsausdruck

**Verringerte Vagus
Aktivität**

Emotional
Acute
Phase
Response

- Energie-Aufnahme durch Muskeln
- Testosteron Hoden/
Nebennierenrinde
- Neuroneogenese Hippocampus
- Reabsorption Glukose, Na, H2O
- Hemmt Parasympatikus

Osteocalcin
FGF23

**Knochenabbau
Zahnfleisch
Atrophie**

N. Vagus Speichel

H₂O

Lactoperoxidase

Thiocyanat
SCN⁻

sIgA

Amylase gering

Langsame
Kohlenhydrate

Benigne Pathogenen
S. mitis
S. mutans
S. sobrinus

Verpflichtete
Multi-Zucker
Bakterien

Oxidase
H₂O₂

H₂O₂

SCN⁻

Protein-S

Anti-Viral
Anti-Bakteriell
Anti-Fungizid

H₂O

LP

SCNO⁻

Protein

Protein-SCN

Fahrplan

1. Problembestimmung
2. SIBO
3. Pathogene Flora
4. Pankreas-Problem
5. Lieferproblem
6. Antibiotika
7. Leckagen im Darm
8. Stressdarm
9. Weitere offene Barrieren
10. Systemische 'Darm'-Symptome

2. Lösungen
 - Glutamin
 - Prebiotika
 - Probiotika
 - Stressabbau
 - SGLT-Hemmung
 - Laktoferrin
 - Antibiotikum für den Darm
 - DPP IV-Behandlung

Substanz P.	= Arg Pro Lys Pro Gln Gln Phe Phe Gly Leu Met
Glucose Induced Protein	= Insulin Produktion, Insulin Empfindlichkeit
Glucagon Like Peptide	= Muskeln, Leber und Fett

Dipeptidylpeptidase 4 (DPP-IV)

Arg-Pro
Lys-Pro
Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met

Protease

Arg, Pro, Lys, Pro
Gln, Gln, Phe, Phe, Gly, Leu, Met

Stuhl

Farbe - Leichtbraun
Menge - 200 Gr/Tag
Komposition - Typ 4
Geruch - Geruchlos
Gas - 'Geruchlos - Methangas'
Krämpfe - Pathologie - SP
'Stille Verstopfung' - Exorphin
'Schmerzhafte Verstopfung'
SCFA, Mikrobiom
Magnesium Mangel

Bristol Stool Chart

Type 1		Separate hard lumps, like nuts (hard to pass)
Type 2		Sausage-shaped but lumpy
Type 3		Like a sausage but with cracks on its surface
Type 4		Like a sausage or snake, smooth and soft
Type 5		Soft blobs with clear-cut edges (passed easily)
Type 6		Fluffy pieces with ragged edges, a mushy stool
Type 7		Watery, no solid pieces. Entirely Liquid

DPPIV Mangel
Capsaicin/Senf/Wasabi
Äpfel - Baobab - Rucola

1. Substance P wird normal abgebaut,
Exorphine nehmen zu

Morphin Darm - Stille Verstopfung

2. Substance P nimmt zu (Leaky gut)
Exorphine Abbau

Krämpfe Verstopfung (SCFA)
Krämpfe Durchfall (Substanz P)
Extra-Intestinal Disorders = Migraine,
Schmerz, Depression, Hautkrankheiten,
Erschöpfung

3. Substance P Abbau Normal
GIP und GLP nehmen zu
Exorphine nehmen zu und kommen
in die Blutbahn

Stille Verstopfung
Zombies
Glucose Spiegel Perfekt
Körpergewicht prima
Diabetes Gefahr verringert
Alzheimer/Demenz/Autismus

Breakdown of SP is also dependent on DPP IV activity. SP has neurological, immunological, and endocrinological functions and influences pain sensitivity, gut peristaltic, inflammation, and social interaction [63]. Increased concentrations of SP in the gut can produce abdominal pain with diarrhea [64] and angioedema with swelling and abdominal pain [65]. High SP levels in the gut can even produce pancreatitis together with abdominal pain, diarrhea, and vomiting [66]. A recent double-blind placebo-controlled human trial showed that the intake of a small amount of gluten (4.375 g/day for 1 week) significantly increased intestinal and extra-intestinal symptoms in individuals with self-reported gluten sensitivity [67]. Typical intestinal symptoms such as bloating and abdominal pain were increased after 1 week of gluten intake, as were extra-intestinal symptoms, such as depression and aphthous stomatitis. Because in patients suffering from NCGS no known intestinal lesions or other biomarkers such as antibodies against gluten/gliadin/self-antigens seem to be present [68], their symptoms have to be explained by different pathways. NCGS presents itself with intestinal symptoms like diarrhea, abdominal discomfort, and flatulence, while headache, lethargy, attention-deficit/hyperactivity disorder, ataxia, or oral ulceration appears as an extra-intestinal symptom [3, 67]. Most,

Die maximale Aufnahme von Kasein und Gluten sollte niemals 4,5 Gramm/Tag überschreiten.

Ongeveer 60 % aller Proteine sind Gluten.

	Energie	Energie	Water	Eiwit	Koolh.	Suikers	Vet	Verzad.	E.o.v.	M.o.v.	Cholest.	Vezels	Gevoel	Gezondheid
Eenheid per 100 gram	kcal	kJ	g	g	g	g	g	g	g	g	mg	g		
Sorteren	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲
Amandelbroodje	490	2054	9,6	7,6	50,7	28,5	28,1	11,8	8,6	3,2	30,0	3,0	6,0	3,7
Boerenbrood	307	1287	25,3	11,3	56,3	0,7	3,1	1,2	1,0	0,7	23,0	3,0	7,7	8,1
Brood, bruin	256	1076	37,0	7,0	45,6	2,9	3,7	1,3	1,4	0,9	1,5	5,7	8,7	8,7
Brood, geroosterd, gemiddeld	370	1553	11,0	13,5	68,0	14,5	4,0	1,0	0,9	1,5	0,0	2,5	7,0	7,5
Brood, meergranen	262	1099	35,2	9,5	45,0	2,0	3,4	1,2	1,2	1,0	1,0	5,9	8,4	8,8
Brood, rogge, donker	198	833	47,0	5,5	36,0	12,5	1,5	0,2	0,5	0,6	1,0	9,0	7,6	8,5
Brood, rogge, gem.	242	1016	39,8	6,2	44,5	4,0	3,0	1,0	0,8	1,1	1,0	5,5	7,4	8,4
Brood, rozijnen	273	1144	35,4	6,8	49,0	10,6	4,6	2,1	1,6	0,4	28,0	3,2	7,5	7,1
Brood, tarwe	266	1117	34,3	8,2	48,8	2,4	3,0	1,2	0,9	0,9	1,5	4,7	8,4	8,6
Brood, tarwe/rogge	220	922	43,7	6,7	41,5	2,0	1,6	0,3	0,4	0,8	0,0	5,5	7,8	8,1
Brood, volkoren	246	1033	37,6	8,4	43,5	1,5	2,6	0,5	0,5	1,2	0,5	6,9	8,5	8,7
Brood, wit, melk	255	1070	38,8	9,2	45,0	4,5	3,5	1,8	1,0	0,5	3,5	2,5	5,8	4,7
Brood, wit, water	236	991	41,7	8,3	44,5	3,0	2,0	0,5	0,4	0,8	0,0	2,5	4,8	4,1
Brood, zuurdesem	206	864	46,4	7,5	35,4	0,0	2,0	0,3	0,3	1,0	0,5	7,7	6,5	7,1
Broodje, kadetje gem.	282	1183	33,2	8,5	50,0	0,0	4,5	2,0	1,0	1,0	8,0	2,8	7,4	5,8
Eekhoortjesbrood	20	84	93,4	2,5	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	5,5	6,9
Kokosbrood	446	1868	18,4	4,3	35,0	31,0	30,0	27,0	2,0	1,0	0,0	11,3	5,1	4,6
Krentenbrood/bol	283	1187	31,3	7,5	54,0	14,0	3,2	2,0	1,0	0,1	5,0	3,0	7,4	6,7
Pitabroodje	267	1120	32,8	8,8	52,0	2,0	1,5					3,9	6,7	6,4
Rozijnenbrood	289	1214	35,0	6,3	46,0	9,3	8,0	4,3	2,2	0,7	0,0	3,7	7,4	6,2

Tabel 1: Samenstelling van volle koemelk, geitenmelk, schapenmelk en paardenmelk (per 100 ml)

	Koemelk (volle)	Geitenmelk	Schapenmelk	Buffelmelk	Paardenmelk
Energie (kcal)	64	67	96	108	47
Lactose (g)	4,6	4,2	4,6	4,9	6,2
Eiwitten (g)	3,3	3,7	5,3	4,0	2,2
Caseïne (g)	2,7	2,9	4,5	3,5	1,2
Vetten (g)	3,6	3,9	6,3	8,0	1,5
Natrium (mg)	45	42	30	40	-
Calcium (mg)	120	127	183	195	110
Fosfor (mg)	92	109	115	130	54
Kalium (mg)	141	181	182	100	64
Zink (mg)	0,36	0,26	0,47	0,6	0,002
Vitamine B2 (mg)	0,18	0,15	0,23	0,10	0,030
Vitamine B12 (µg)	0,41	0,07	0,51	0,30	0,3
Vitamine A (µg ^l)	31	74	51	64	17
Vitamine D (µg)	0,174	0,25	-	121 -	-

DPP IV wird durch das verbleibende

A2 beta-casein
A1 beta-casein

Tyr-Pro
Phe-Pro
Gly-Pro-Ile

Tag 1

15.45 - 17.00

Das enterische Nervensystem

Der neuronale Plexus im Darm stellt ein selbständig funktionierendes Netzwerk, das sogenannte enterische Nervensystem, dar, das über den Parasympathikus und den Sympathikus mit dem zentralen autonomen neuronalen Netzwerk im Zentralnervensystem verbunden ist. Das enterische Nervensystem kann die Effektorensysteme im Darm direkt oder indirekt durch seine Wirkung auf die Interneurone beeinflussen, zu denen die endokrinen Zellen, die Zwischenzellen von Cajal und Zellen des Immunsystems, wie z.B. Mastzellen, gehören. Die Zellkörper der primären vagalen und primären splanchnian-afferenten Neuronen befinden sich in den knötchenförmigen Ganglien bzw. den dorsalen Wurzelganglien, die jeweils unterschiedliche Informationen vom Darm zum Zentralnervensystem transportieren. Das Symbol repräsentiert die Enden des Afferenten und die Pfeile stellen die Antwort der neuronalen Übertragung dar.

5-HT = Serotonin = 85% Darm
 NO = Stickstoff Monoxid
 VIP = Vasoactive Intestine Peptide
 ATP = Energie

Die Peristaltik ist das Ergebnis einer Reihe von lokalen Reflexen, die sich jeweils aus einer Kontraktion des Darmmuskels über eine intraluminalen Stimulation und Entspannung der Muskeln unter dem Stimulus (Einsatz, linke obere Ecke). Die Freisetzung von 5-HT durch die Schleimhaut
 Die Stimulation oder mechanische Ausdehnung des Darmlumens (Hauptpanel) löst die Aktivität der intrinsisch afferenten Neuronen aus (). Oberhalb der Reizstelle geben aufsteigende cholinerge Interneuronen () dieses Signal an erregende Motoneuronen () weiter, die Acetylcholin (ACh) und Substanz P enthalten. Dadurch kontrahiert das kreisförmige Muskelbündel hinter dem Bolus, während vor dem Bolus alle Muskeln entspannen.

THE ENTERIC NERVOUS SYSTEM. NEJM 1996
 RAJ K. GOYAL, M.D., AND IKUO HIRANO, M.D

Tryptophan Mangel (Serotonin) - Eier, Milch
Arginin Mangel (NO) - Mandeln, Cashewkerne, Lachs

Acetylcholin Mangel - Cholin Mangel (Eier, Fisch, Schalentiere)
PS Aktivität Mangel

ATP Mangel - 5000 Zucker-Molekule
Short Chain Fatty Acids - Mikrobiom

Stress - Chronisch/Unbekannte/Unausweichbar

Substanz P Erhöhung = Gluten/Kasein

Wasserhaushalt Störung

Gehirn-Entzündung

Das ENS; ein hochkomplexes Nervensystem, das einen großen Einfluss auf alle Syndrome hat.

Darm-microbioma-
Hersen-als

Neurodegeneratie
ter wille van de
consistentie

Figure 4. Summary of primary disease interactions between the gut and brain
 A β , amyloid-beta; ALS, amyotrophic lateral sclerosis; ASD, autism spectrum disorder;
 PrP^{Sc}, prion protein scrapie.

...To impact central and peripheral glucose homeostasis

Enterosynes sind Substanzen, die das ENS beeinflussen und bei Stoffwechsel- und neurodegenerativen Erkrankungen eine Rolle spielen.

Gut-brain axis

Hormonal & neuronal Enterosynes

- Neuropeptides (galanin)
- Epithelial peptides (apelin)
- Incretins (GLP-1...)

Nutritional Enterosynes

- Glucose
- Free fatty acids
- Amino acids (glutamine, cysteine, glycine, glutamic acid)

ENS targeting to control gut motility...

Immune Enterosynes

- Proinflammatory cytokines (TNF- α)
- Interleukins (IL-1 β)

Bacterial Enterosynes

- SCFA (acetate, propionate, butyrate)
- Microbiota-derived neurotransmitters (derived from serotonin, histamine, GABA, catecholamines...)
- Gaseous neurotransmitters (NO, H₂S)¹²⁹

Claude Knauf et al. Targeting the Enteric Nervous System to Treat Metabolic Disorders? "Enterosynes" as Therapeutic Gut Factors. Neuroendocrinology 2019

Stuhl

Farbe - Leichtbraun
Menge - 200 Gr/Tag
Komposition - Typ 4
Geruch - Geruchlos
Gas - 'Geruchlos - Methangas'
Krämpfe - Pathologie - SP
'Stille Verstopfung' - Exorphin
'Schmerzhafte Verstopfung'
SCFA, Mikrobiom
Magnesium Mangel

Bristol Stool Chart

Type 1		Separate hard lumps, like nuts (hard to pass)
Type 2		Sausage-shaped but lumpy
Type 3		Like a sausage but with cracks on its surface
Type 4		Like a sausage or snake, smooth and soft
Type 5		Soft blobs with clear-cut edges (passed easily)
Type 6		Fluffy pieces with ragged edges, a mushy stool
Type 7		Watery, no solid pieces. Entirely Liquid

Tag 1
17.00 - 17.15
kahoot.it